



CONSULTATION EN GYNÉCOLOGIE ADULTE

Attention : Consulter les alertes cliniques au verso. Favoriser les protocoles de l'Accueil clinique pour les grossesses du premier trimestre.

Ce formulaire ne s'applique pas pour les grossesses au-delà de 14 semaines.

Nom et prénom de l'usager	
N° d'assurance maladie	Année Mois Expiration
Nom et prénom du parent	
Ind.rég. Nº téléphone	Ind. rég. N° téléphone (autre)
Adresse	
Code	postal

	ison de consultation	Échelle	e de priorité clinique	: A:	≤ 3 jrs	B : ≤ 10 jr	s C:	≤ 28 jrs	D : ≤ 3 mois	E : ≤ 12 m	ois	
Saignements utérins anormaux (SUA)	Post-ménopausiques			С	nent	Polypes d l'endomèt	e		st-ménopausique ns SUA	es	D	
ents ui	Pré-ménopausiques (Préreguis : Hb, B-HCG	☐ Hb < 80			sisser ìètre	rendomet	Pré-ménopausiques			s	Е	
gneme	et rapport d'échographie pelvienne)	Hb entre 80 et 120		D	es et épaississe de l'endomètre	Épaississement de l'endomètre > 11 mm					D	
						C C D est size size size size size size size size			ménopausique equis : rapport échographie endovaginale)			
mes	Fibromes > 10 cm ou signes/symptômes compressifs (Prérequis : rapport d'échographie pelvienne)				Polyl	Polype du col avec cytologie normale					Е	
Fibromes	Fibromes asymptomatiques et Hb normale					Pathologies vulvaires/vaginales bénignes					Е	
	(Prérequis : rapport d'é	chographie pel			Vulvo- vaginal	Uulvo-vaginites récidivantes et réfractaires					Е	
<u>e</u>	Post-ménopausique (Prérequis : rapport d'échog	ıraphie	Complexe ¹	С		Dyspareunie ou vaginisme					Е	
Masse annexielle	pelvienne et Ca-125)		Simple	D			Contraception complexe, ligature tubaire ou stérilet Infertilité²					
e anı	Pré-ménopausique, masse persistante > 3 cm		Complexe ¹	С	-							
lasse	(Prérequis : 2 rapports d'écl pelvienne ≥ 2 mois d'interva		Simple	D			enorrhée secondaire de > 6 mois					
2	Avec ascite ou carcir (Prérequis : rapport d'ir		itonéale	В	Autres		quis : TS		D			
	Cytologie anormale ou lésion du col visuellement suspecte				Au	Méno	opause complexe (Prérequis : justifier le besoin)					
Néoplasie		Référer directement au Centre de colposcopie de votre territoire				Prola _l	rolapsus génital symptomatique ³					
léop	Lésion vulvaire ou vaginale suspecte				-	Endométriose suspectée ou douleur pelvienne chronique (> 6 mois) (Prérequis : rapport d'échographie pelvienne)						
		Néoplasie de l'endomètre confirmée (Prérequis : rapport de pathologie)										
Autre raison de consultation non standardisée au formulaire ou modification d'une priorité clinique (justification OBLIGATOIRE dans la section suivante) : Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires Si prérequis exigé(s) :												
	pression diagnostique e	et renseigne	ements chinques c	bligat	ones				Disponible(s) d			
								- -	Annexé(s) à la p		nande	
Re	soins spéciaux ⁴ :									p. 0000 uo		
Identification du médecin référent et du point de service Nom du médecin référent N° de permis												
مر امما	g. N° de téléphone	NO do so	ooto Indués N	٥ مام خفاظ	copieur							
Ind. ré	g. N° de telepriorie	N° de p	oste Ind. rég. N	de tele	copieur							
Nom d	u point de service	I					1					
			I	Date (a	nnée, mo	ois iour)	-					
Signature												
Médecin de famille : ■ Idem au médecin référent ■ Usager sans médecin de famille Référence nominative (si requis)												
Nom du médecin de famille Si vous désirez une référence à un médecin ou à u point de service en particulier										un		
Nom du point de service												

Légende

- ¹ Description masse annexielle complexe : hétérogène, zone solide, avec septa
- ² Définition de l'infertilité :
 - Infertilité ≥ 1 an AVEC cycles réguliers ET âgée < 35 ans
 - Infertilité ≥ 6 mois AVEC cycles irréguliers OU âgée ≥ 35 ans
 - Spermogramme anormal
 - ≥ 3 avortements spontanés
- ³ Prolapsus génital symptomatique : cystocèle, rectocèle, prolapsus utérin ou évaluation de pessaire
- ⁴ Inscrire l'indice de masse corporelle si > 35, si mobilité réduite, besoin d'interprète, etc.

Alertes cliniques (liste non exhaustive)

Diriger l'usager vers l'urgence

- Grossesse ectopique soupçonnée ou confirmée
- Ménorragie aiguë importante
- Hyperemesis gravidarum avec déshydratation
- Abcès de la glande de Bartholin
- Infection pelvienne aiguë avec ou sans abcès
- Prolapsus génital complet en rétention urinaire
- · Avortement avec saignement actif important ou fièvre
- Saignement du 1er trimestre ou

Orienter la femme vers les ressources disponibles dans la région : Accueil clinique (utiliser formulaire approprié), clinique du 1er trimestre

Les services suivants doivent être orientés en 1re ligne et non pas au CRDS :

Visite gynécologique de santé préventive, incluant :

- Examen annuel/cytologie cervico-vaginale (PAP test)/dépistage ITSS
- Ménopause
- Contraception

N.B. Les maladies du sein ne sont pas prises en charge par la gynécologie