



DT9355	Prénom		
URETÈRE - BASSINET RÉNAL	N° d'assurance maladie		
Version 3.4.0.0	Adresse		
NO de constant	Code postal Ind. rég. Téléphone Sexe		
N° de rapport	□ M □ F		
Type d'intervention : Biopsie Résection/Néphro-urété page 1 page 4	rectomie, partielle ou complète		

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

URETÈRE ET BASSINET RÉNAL : Biopsie
+ Spécimen (note A)
+ Bassinet rénal
+ Uretère
+ Autre (préciser) :
+ Non précisé
+ Latéralité du spécimen
+ Gauche
+ Droit
+ Non précisée
+ Type tumoral
+ Carcinome infiltrant
+ Carcinome non-infiltrant
+ Carcinome in situ
+ Type histologique (note B)
+ Type histologique (note B) + Carcinome urothélial (transitionnel)
+ Carcinome urothélial (transitionnel)
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
+ Carcinome urothélial (transitionnel) + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation épidermoïde + Carcinome urothélial (transitionnell) avec différenciation glandulaire + Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :

Source: Humphrey PA, et coll., pour les membres du Cancer Committee du College of American Pathologists. Protocol for the Examination of Specimens From Patients with Carcinoma of the Ureter and Renal Pelvis. Version UreterRenalPelvis 3.4.0.0. College of American Pathologists (CAP), 2013. Disponible en ligne à l'adresse: www.cap.org. Traduction et adaptation française autorisées, non validées par le CAP.

N° de rapport			N° de dossier	
+ Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)				
+ Aucune décelée				
+ Papillome urothélial (transitionnel) (Organisation mondiale de la santé (OMS)/International Society of Urologic Pathology (ISUP), 1998, OMS 2004)				
+ Néoplasie urothéliale (transitionnelle) papillaire, à faible potentiel de malignité (OMS/ISUP 1998, OMS 2004)				
+ Ne peuvent être déterminées				
		s les éléments applicables) (note C)		
+ Non applic				
+ Carcinome	re déterminé			
	Bas-grade			
	Bas-grade Haut-grade			
	-			
	e épidermoïde ou adénoca			
	GX : Ne peut être évalué	aromome		
_	G1 : Bien-différencié			
	G2 : Modérément différen	cié		
	G3 : Peu différencié			
_	Autre (préciser) :			
+ Autre carci				
+ 🔲	Bas-grade			
+ 🔲	Haut-grade			
+ 🗌 /	Autre (préciser) :			
+ Configuration	tumorale (sélectionner	tous les éléments applicables)		
+ Papillaire				
+ Solide/nod	ulaire			
+ Plane				
+ Ulcérée				
+ Indétermin				
+ 🔛 Autre (préd	ciser):			
	uat pour déterminer la d	catégorie T (note D)		
	se non décelée			
+ Musculeus	•			
+ Indétermin				
	morale microscopique (note E)		
+ Ne peut êt				
	idence de tumeur primair	е		
+ Carcinome	e papillaire non-infiltrant			
	e in situ vahit le tissu conjonctif so	us ánithálial		
	ıvahit la musculeuse	us-epitileliai		
+ Tumeur er	ıvahit, au delà de la musc	uleuse, le tissu adipeux péripyélique ou le	e parenchyme rénal	(pour bassinet rénal
seulement	•	desired to the constitution of the office of		
		ıleuse, le tissu adipeux péri-urétéral (pour jacent(s), ou envahit, à travers le rein, jus	•	périrénal

N° de rapport			N° de dossier	
+ Stade pathol	ogique (pTNM) (note E)			
		cables) (sélectionner tous les éléments a	ipplicables)	
<u></u>	rs primaires multiples)			
+ _ r (récidive				
+ y (post-tra	itement)			
Tumeur primai				
	eut être évaluée			
	le évidence de tumeur prin			
	iome papillaire non-infiltrar nome in situ plan	TIL.		
		tif sous-épithélial (chorion muqueux)		
	ur envahit la musculeuse	iii sous-epitileliai (chohon muqueux)		
-		(sélectionner tous les éléments applic	ables)	
		a-urothéliale de bas-grade)		
	ion/changements régénéra	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u></u>	ents liés à une thérapie			
	e cautérisation			
<u> </u>	ou pyélite kystique et gland	dulaire		
	e malpighienne avec kérat			
	e intestinale			
<u> </u>	ciser) :			
+ Commentaire				

|--|--|--|

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

BASSINET RÉNAL : RÉSECTION/NÉPHRO-URÉTÉRECTOMIE, PARTIELLE OU COMPLÈTE
Procédure (note F)
Néphro-urétérectomie partielle
Néphro-urétérectomie complète
Autre (préciser) :
☐ Non précisée
Latéralité du spécimen
☐ Droit
Gauche
☐ Non précisée
Taille de la tumeur
Dimension la plus grande : cm
+ Autres dimensions : x cm
☐ Ne peut être déterminé (voir « Commentaire(s) »)
Type tumoral
☐ Carcinome infiltrant
☐ Carcinome non-infiltrante
☐ Carcinome in situ
Type histologique (note B)
Carcinome urothélial (transitionnel)
Carcinome urothélial (transitionnel) avec différenciation épidermoïde
Carcinome urothélial (transitionnel) avec différenciation glandulaire
Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
Carcinome épidermoïde, typique
Carcinome épidermoïde avec variante histologique (préciser) :
Adénocarcinome, typique
Adénocarcinome avec variante histologique (préciser) :
Carcinome à petites cellules
Carcinome indifférencié (préciser) :
Type mixte (préciser) :
Autre (préciser) :
Carcinome, dont le type ne peut être déterminé
Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)
Aucune décelée
Papillome urothélial (transitionnel) (Organisation mondiale de la santé (OMS)/International Society of Urologic Pathology (ISUP), 1998, OMS 2004)
Papillome urothélial (transitionnel), de type inversé
☐ Néoplasie urothéliale (transitionnelle) papillaire, à faible potentiel de malignité (OMS/ISUP 1998, OMS 2004)
☐ Ne peuvent être déterminées

N° de rapport	N° de dossier
Grade histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (not	te C)
Non applicable	
Ne peut être déterminé	
☐ Carcinome urothélial	
☐ Bas grade	
Haut grade	
Autre (préciser) :	
☐ GX : Ne peut être évalué	
G1 : Bien-différencié	
G2 : Modérément différencié	
G3 : Peu différencié	
Autre (préciser) :	
Autre carcinome	
□ Bas grade	
☐ Haut grade	
Autre (préciser) :	
Extension tumorale microscopique (note E)	
☐ Ne peut être évaluée	
Aucune évidence de tumeur primaire	
Carcinome papillaire non-infiltrant	
Carcinome in situ	
Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial	
☐ Tumeur envahit la musculeuse	www.a.u.la.maranah.maa.mémal
 Tumeur envahit, au delà de la musculeuse, le tissu adipeux péripyélic Tumeur envahit un ou des organe(s) adjacent(s), ou envahit, à travers 	
+ Configuration tumorale (sélectionner tous les éléments applicable	
	5)
+	
+ Plane	
+ Ulcérée	
+ Indéterminée	
+ Autre (préciser) :	
Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note G)	
Ne peuvent être évaluées Marga(a) attainta(a) par la carainama infiltrant	
Marge(s) atteinte(s) par le carcinome infiltrant	
Préciser la/les marge(s) :	
Marge(s) atteinte(s) par le carcinome in situ/carcinome urothélial de h	-
Préciser la/les marge(s) :	
Marge(s) exemptes de carcinome infiltrant/carcinome in situ/carcinom	-
+ Distance entre le carcinome et la marge la plus proche :	
+ Préciser la marge la plus proche :	
+ Autres changements significatifs au niveau de la marge (préciser la marge) :
+ Dysplasie de bas grade	
+ ☐ Carcinome urothélial de bas grade, non-infiltrant	

N° de rapport		N° de dossier	
	-		
+ Envahissement lymphovasculaire (n	ote H)		
+ Non décelé			
+ Présent			
+ Indéterminé			
Stade pathologique (pTNM) (note E)			
Descripteurs TNM (seulement si applica	bles) (sélectionner tous les éléments app	olicables)	
m (tumeurs primaires multiples)			
r (récidive)			
y (post-traitement)			
Tumeur primaire (pT)			
pTX : Ne peut être évaluée			
pT0 : Aucune tumeur primaire décelé	е		
pTa : Carcinome papillaire non-infiltra	nt		
pTis : Carcinome in situ			
pT1 : Tumeur envahit le tissu conjond	tif sous-épithélial (chorion muqueux)		
pT2 : Tumeur envahit la musculeuse			
pT3 : Tumeur envahit, au delà de la mu	sculeuse, le tissu adipeux péripyélique ou l	e parenchyme rénal	
pT4 : Tumeur envahit un organe adja	cent, ou envahit, à travers le rein, le tissu	adipeux périrénal	
Ganglions lymphatiques régionaux (pl	N)		
pNX : Ne peuvent être déterminés			
pN0 : Ganglions lymphatiques région	aux exempts de métastatse		
pN1 : Métastase à un seul ganglion lym	phatique régional, mesurant 2 cm ou moins	dans sa dimension la plus	grande
	mphatique régional, mesurant plus de 2 d blus d'un ganglion lymphatique régional, d		
pN3 : Métastase à un ganglion lymph	atique régional de plus de 5 cm dans sa	plus grande dimension	
Aucun ganglion repéré ou soumis pou	ur examen		
Nombre de ganglions lymphatiques exam	ninés		
Préciser :			
Nombre ne peut être déterminé (expli	quer) :		
Nombre de ganglions lymphatiques atteir	nts (quelle que soit la taille)		
Préciser :			
Nombre ne peut être déterminé (expli	quer) :		
Métastase(s) à distance (pM)			
☐ Non applicable			
pM1 : Métastase à distance			
+ Préciser le site, si connu :			

N° de rapport N° de dossier			
+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)			
+ Dysplasie urothéliale (néoplasie intra-urothéliale de bas grade)			
+ Inflammation/changements régénératifs			
+ Changements liés à une thérapie			
+ Pyélite kystique et glandulaire			
+ Métaplasie malpighienne avec kératinisation			
+ Métaplasie intestinale			
+ Lithiase			
+ Autre (préciser) :			
Constatations pathologiques au niveau du tissu rénal ipsilatéral, non néoplasique, (sélectionner tous les éléments applicables) (note l)			
Tissu insuffisant (spécimen de néphrectomie partielle avec <5 mm de tissu rénal non-néoplasique adjacent)			
Altérations pathologiques significatives			
☐ Aucune décelée			
Maladie glomérulaire (type) :			
Maladie tubulo-interstitielle (type) :			
Maladie vasculaire (type) :			
Inflammation (type) :			
Autre (préciser) :			
+ Commentaire(s) :			

N° de rapport N° de dossier

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

URETÈRE : RÉSECTION
Procédure
☐ Urétérectomie
Autre (préciser) :
☐ Non précisée
Latéralité du spécimen
☐ Droit
☐ Gauche
☐ Non précisée
Taille de la tumeur
Dimension la plus grande : cm
+ Autres dimensions : x cm
☐ Ne peut être déterminé (voir « Commentaire(s) »)
Type tumoral
☐ Carcinome infiltrant
☐ Carcinome non-infiltrante
☐ Carcinome in situ
Type histologique (note B)
Carcinome urothélial (transitionnel)
Carcinome urothélial (transitionnel) avec différenciation épidermoïde
Carcinome urothélial (transitionnel) avec différenciation glandulaire
Carcinome urothélial (transitionnel) avec variante histologique (préciser) :
☐ Carcinome épidermoïde, typique
Carcinome épidermoïde avec variante histologique (préciser) :
Adénocarcinome, typique
Adénocarcinome avec variante histologique (préciser) :
☐ Carcinome à petites cellules
Carcinome indifférencié (préciser) :
Type mixte (préciser) :
Autre (préciser) :
Carcinome, dont le type ne peut être déterminé
Lésions épithéliales associées (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)
Aucune décelée
Papillome urothélial (transitionnel) (Organisation mondiale de la santé (OMS)/International Society of Urologic Pathology (ISUP), 1998, OMS 2004)
Papillome urothélial (transitionnel), de type inversé
☐ Néoplasie urothéliale (transitionnelle) papillaire, à faible potentiel de malignité (OMS/ISUP 1998, OMS 2004)
☐ Ne peuvent être déterminées

N° de rapport	N° de dossier
Grade histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note C)	
☐ Non applicable	
Ne peut être déterminé	
Carcinome urothélial	
☐ Bas grade	
Haut grade	
Autre (préciser) :	
Carcinome épidermoïde ou adénocarcinome	
GX : Ne peut être évalué G1 : Bien-différencié	
G2 : Modérément différencié	
G3 : Peu différencié	
Autre (préciser) :	
Autre carcinome	
☐ Bas grade	
Haut grade	
Autre (préciser) :	
Extension tumorale microscopique (note E)	
☐ Ne peut être évaluée	
Aucune évidence de tumeur primaire	
Carcinome papillaire non-infiltrant	
☐ Carcinome in situ	
☐ Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial	
☐ Tumeur envahit la musculeuse	
Tumeur envahit, au-delà de la musculeuse, le tissu adipeux péri-urétéral	
☐ Tumeur infiltrant un organe adjacent	
+ Configuration tumorale (sélectionner tous les éléments applicables)	
+ Papillaire	
+ Solide/nodulaire	
+ ☐ Ulcérée	
+ Plane	
+ Indéterminée	
+ _ Autre (préciser) :	_
Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (note G)	
☐ Ne peuvent être évaluées	
☐ Marge(s) atteinte(s) par le carcinome infiltrant☐ Marge muqueuse proximale	
Marge muqueuse distale	
Marge des tissus mous (profonde)	
Autre(s) marge(s) (préciser) :	
☐ Marge(s) atteinte(s) par le carcinome in situ/carcinome urothélial de haut gra	
Marge muqueuse proximale	ao, non initian
☐ Marge muqueuse distale	
Autre(s) marge(s) (préciser) :	
☐ Marge(s) exemptes de carcinome infiltrant/carcinome in situ/carcinome uroth	
+ Distance entre le carcinome et la marge la plus proche : m	m
+ Préciser la marge la plus proche :	
+ Autres changements significatifs au niveau de la marge (précise	· la marge) :
+ Dysplasie de bas grade	

+ Carcinome urothélial de bas grade, non-infiltrant

N° de rapport			N° de dossier					
+ Envahissement lymphovasculaire (note H)								
+ Non décelé								
+ Présent								
+ Indéterminé								
Stade pathologique (pTN								
	ement si applicables) (sélectionn	er tous les éléments app	olicables)					
` .	m (tumeurs primaires multiples)							
r (récidive)								
y (post-traitement)								
Tumeur primaire (pT)								
pTX : Ne peut être évalu								
	pT0 : Aucune tumeur primaire décelée							
pTa : Carcinome papillaire non-infiltrant								
pTis : Carcinome in site	pTis : Carcinome in situ							
pT1 : Tumeur envahit l	pT1 : Tumeur envahit le tissu conjonctif sous-épithélial (chorion muqueux)							
pT2 : Tumeur envahit la musculeuse								
pT3 : Tumeur envahit, a	au delà de la musculeuse, le tissu	adipeux péri-urétéral						
D pT4 : Tumeur envahit ι	un ou des organe(s) adjacent(s)							
Ganglions lymphatiques	régionaux (pN)							
DNX : Ne peuvent être é	□ pNX : Ne peuvent être évalués							
pN0 : Ganglions lymph	pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastases							
pN1 : Métastase à un seul ganglion lymphatique régional, mesurant 2 cm ou moins dans sa dimension la plus grande								
pN2 : Métastase à un seul ganglion lymphatique régional, mesurant plus de 2 cm, mais pas plus de 5 cm dans sa dimension la plus grande; ou métastases à plus d'un ganglion lymphatique régional, dont aucune ne mesure plus de 5 cm dans sa dimension la plus grande								
pN3 : Métastase à un ganglion lymphatique régional de plus de 5 cm dans sa dimension la plus grande								
Aucun ganglion repéré	é ou soumis pour examen							
Nombre de ganglions lymphatiques examinés								
Préciser :								
	déterminé (expliquer) :							
Nombre de ganglions lymphatiques atteints (quelle que soit la taille)								
Préciser :								
Nombre ne peut être déterminé (expliquer) :								
Métastase(s) à distance	(pM)							
Non applicable								
pM1 : Métastase à distance								
+ Préciser le site, si connu :								

N° de rapport		N° de d	ossier							
+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)										
+ Dysplasie urothéliale (néoplasie intra-urothéliale de bas grade)										
+ Inflammation/changements régénératifs										
+ Changements liés à une thérapie										
+ Pyélite kystique et glandulaire										
+ Métaplasie malpighienne avec kér	atinisation									
+ Métaplasie intestinale										
+ Autre (préciser) :										
+ Commentaire(s) :										
Signature du	, N°	de permis	Deta	Année	Mois	Jour				
pathologiste			Date							