



CONSULTATION EN RHUMATOLOGIE ADULTE

Attention:

- 1- Consulter les alertes cliniques au verso.
- 2- Favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.

Nom et pi	rénom de l'usager						
N° d'assurance maladie		Année Mois					
		Expiration					
Nom et pi	rénom du parent						
Ind.rég.	N° téléphone	Ind. rég.	Nº téléphone (autre)				
Adresse							
	Cod	le postal					

Raison de	consultatio					jrs C:≤28 jrs D:: CRDS; utiliser les corrido				
Arthropathie inflammatoire (excluant arthrose) Polymyalgie rheumatica² sans symptôme d'artérite temporale ≥50 ans (Prérequis : FSC, VS, CRP)										В
Suspicion d'arthrite microcristalline	sta	Goutte récidivante malgré traitement standard ou goutte tophacée			ou vasculite	Myopathie inflammatoire, avec au moins 2 valeurs de CK ≥ à 1,5 fois la normale (<i>Prérequis : CK, ANA</i>)			С	
(Prérequis : FSC, CRP, créatinine, acide urique, RX)		Arthrite avec suspicion de pseudogoutte ou hydroxyapatite						De novo	С	
polyarthrite chronique ≥ 4 semaines (Prérequis : FSC, CRP, créatinine, ALT, facteur rhumatoïde, anti-CCP, RX)	Avec synovites	Facteur rhumatoïde ou anti-CCP ou CRP ≥ 15 ou antécédent de psoriasis ou érosion radiologique	Positif	C D	ose or	(Prérequis : FSC, CRP, cr Consulter les alertes clinic	FSC, CRP, créatinine, analyse d'urine) a alertes cliniques		Connue et stable	D
	claires		Négatif		Collagénose	de novo ou connue créatinine, analyse d'u	Collagénose sans atteinte sévère d'organe de novo ou connue (Prérequis : FSC, CRP, créatinine, analyse d'urine) Consulter les alertes cliniques Phénomène de Raynaud isolé		ANA ≥ 1/160	D E
										D
	Avec doute de synovites	Facteur rhumatoïde ou anti-CCP ou CRP ≥ 15 ou antécédent de psoriasis ou érosion radiologique	Positif	D					☐ ANA < 1/160	E
	Syllovites		Négatif	E	Maladie osseuse		porose secondaire ou échec thérapeutique ³ uis : 25(OH) vitamine D, DMO)		E	
Spondylite ou	Antécé				Mala	Maladie de Pag (Prérequis : phos	aget osphatase alcaline, RX, scintigraphie osseuse)			E
sacroiliite ¹ (Prérequis : HLA-B27, RX des	ou de j maladi	psoriasis ou de e inflammatoire nale ou d'ITSS	Positif			Fibromyalgie av	e avec PROBLÉMATIQUE DIAGNOSTIQUE et utique (<i>Prérequis : FSC, CRP, CK, TSH et justifier</i>)			E
sacro-iliaques)	récente	e ou d'une iliite à l'imagerie	☐ Négatif	Е	Autres	Arthrose invalidante non-axiale avec échec au traitement (Prérequis : RX et justifier)			E	
(justific	ation OBL	onsultation non sta IGATOIRE dans la	section su	ivan	te) :		on d'une pri	orité clin	ique Priorité el	inique
Impression	n diagnosti	ique et renseignem	nents cliniq	ues	obliga	toires		Si pré	requis exigé(s) :	
								_ ·	ble(s) dans DSQ (s) à la présente dema	nde
Besoins sp										
Identification du médecin référent et du point de service Nom du médecin référent N° de permis Estampe										
Ind. rég. Nº de	nd. rég. N° de téléphone N° de posi		te Ind. ré	eg. I	N° de télécopieur		-			
Nom du point de s	service						-			
Signature					Date (année, mois, jour)	†			
Médecin de	e famille :	Idem au médecin r	référent L	Jsage	r sans r	nédecin de famille	Référ <u>en</u>	ce nomin	ative (si requis)	
Nom du médecin de famille Si vous désirez une référence à un médecin ou à u point de service en particulier									un	
Nom du point de	service						1			

Légende

- Lombalgie inflammatoire évoluant depuis plus de 3 mois avec début des symptômes < 45 ans, raideur matinale > 1 h, amélioration avec AINS ou activité physique
- ² Polymyalgia rheumatica : douleurs des ceintures scapulaires ou pelviennes débutant après 50 ans avec raideur matinale > 1 h, † VS ou † CRP
- ³ Ostéoporose avec échec thérapeutique :
 - Nouvelle fracture malgré traitement ≥ 12 mois
 - · Diminution significative de la DMO malgré un traitement approprié

Alertes cliniques (liste non exhaustive)

Rejoindre le rhumatologue de garde ou diriger l'usager vers l'urgence

- · Arthrite septique
- · Arthrite avec fièvre
- Artérite temporale avec symptômes (céphalée nouvelle, perte visuelle ou diplopie, douleur au cuir chevelu, claudication de la mâchoire)
- · Vasculite ou collagénose avec atteinte d'organe sévère