



DT9382

**LARYNX**  
Version 3.3.0.0

Date de naissance	N° chambre	N° de dossier	
Nom			
Prénom			
N° d'assurance maladie			
Adresse			
Code postal	Ind. rég.	Téléphone	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

N° de rapport	
---------------	--

Type d'intervention : Biopsie excisionnelle, résection
--

Les éléments de données précédés de ce symbole « + » ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent être cliniquement importants quoique non encore validés ou utilisés régulièrement dans la prise en charge des usagers.

Sélectionner un seul élément, sauf indication contraire.

<b>Prélèvement (sélectionner tous les éléments applicables) (note A)</b>
<input type="checkbox"/> Larynx, supraglottique <input type="checkbox"/> Larynx, glottique <input type="checkbox"/> Larynx, sous-glottique <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisé  Prélèvement reçu : <input type="checkbox"/> À l'état frais <input type="checkbox"/> Dans le formol <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____
<b>Procédure (sélectionner tous les éléments applicables)</b>
<input type="checkbox"/> Biopsie excisionnelle <input type="checkbox"/> Résection <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Excision endo-laryngée</li> <li><input type="checkbox"/> Excision trans-buccale au laser (glotte)</li> <li><input type="checkbox"/> Laryngectomie supra-glottique</li> <li><input type="checkbox"/> Laryngectomie supra-cricoïdienne</li> <li><input type="checkbox"/> Hémi-laryngectomie verticale (préciser le côté) : _____</li> <li><input type="checkbox"/> Laryngectomie partielle (préciser le type) : _____</li> <li><input type="checkbox"/> Laryngectomie totale</li> </ul> <input type="checkbox"/> Ganglions lymphatiques cervicaux - dissection (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Autres (préciser) : _____ <input type="checkbox"/> Non précisée
<b>+ Intégrité du prélèvement</b>
+ <input type="checkbox"/> Intact + <input type="checkbox"/> Fragmenté
<b>Laryngectomie (seulement si applicable)</b>
<input type="checkbox"/> Ouverte <input type="checkbox"/> Non ouverte

N° de rapport

N° de dossier

**Taille du prélèvement**

Plus grande dimension : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

+ Autres dimensions (si plus d'une partie) : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

**Site de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables) (note A)**

Larynx, supra-glottique

Épiglote

Versant lingual

Versant laryngé

Replis aryépiglottiques (droit ou gauche)

Aryténoïde(s)

Bande(s) ventriculaire(s) (droite ou gauche)

Ventricule

Larynx, glottique

Vraie corde vocale (droite ou gauche)

Commissure antérieure

Commissure postérieure

Larynx, sous-glottique

Autres (préciser) : \_\_\_\_\_

Non précisé

Transglottique :

Oui

Non

**Latéralité de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**

Droite

Gauche

Ligne médiane

Non précisée

**Foyers tumoraux**

Un seul foyer

Tumeur bilatérale

Tumeur multifocale (préciser le nombre de foyers tumoraux) : \_\_\_\_\_

**Taille de la tumeur**

Dimension la plus grande : \_\_\_\_ cm

+ Autres dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm

Ne peut être déterminée

**+ Description de la tumeur (sélectionner tous les éléments applicables)**

+ Sous-type macroscopique :

+  Polypoïde

+  Exophytique

+  Endophytique

+  Ulcéré

+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

N° de rapport

N° de dossier

**+ Extension macroscopique de la tumeur**

+ Préciser (toutes les structures anatomiques infiltrées par la tumeur) : \_\_\_\_\_

**Type histologique (sélectionner tous les éléments applicables) (note B)**

**Carcinome épidermoïde**

- Carcinome épidermoïde, conventionnel
- Variantes du carcinome épidermoïde
  - Carcinome épidermoïde acantholytique
  - Carcinome adénoquameux
  - Carcinome épidermoïde basaloïde
  - Carcinome épidermoïde papillaire
  - Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes
  - Carcinome verruqueux
  - Carcinome à cellules géantes
  - Carcinome lymphoépithélial (non-nasopharyngé)

**Carcinome neuroendocrine**

- Tumeur carcinoïde typique (carcinome neuroendocrine bien différencié)
- Tumeur carcinoïde atypique (carcinome neuroendocrine moyennement différencié)
- Carcinome à grandes cellules, type neuroendocrine (carcinome neuroendocrine peu différencié)
- Carcinome à petites cellules, type neuroendocrine (carcinome neuroendocrine peu différencié)
- Carcinome à petites cellules combiné (ou composé), type neuroendocrine avec (préciser le type) : \_\_\_\_\_
- Mélanome muqueux

**Carcinome des glandes salivaires mineures**

- Carcinome adénoïde kystique
  - Bas grade
  - Grade intermédiaire
  - Haut grade
- Carcinome muco-épidermoïde
  - Bas grade
  - Grade intermédiaire
  - Haut grade
- Adénocarcinome (sans autre précision)
  - Bas grade
  - Grade intermédiaire
  - Haut grade
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_
- Carcinome dont le type ne peut être déterminé

**Grade histologique (note C)**

- Non applicable
- GX : Ne peut être évalué
- G1 : Bien différencié
- G2 : Modérément différencié
- G3 : Peu différencié
- Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

**+ Extension microscopique de la tumeur**

+ Préciser (toutes les structures anatomiques infiltrées par la tumeur) : \_\_\_\_\_

**Marges (sélectionner tous les éléments applicables) (notes D et E)** Ne peuvent être évaluées Exemptes de carcinome infiltrant

Distance entre le carcinome infiltrant et la marge la plus proche :

Préciser la distance : \_\_\_\_\_ cm

 Ne peut être évaluée

Préciser la localisation de la marge la plus proche, selon l'orientation, si possible : \_\_\_\_\_

+ Localisation et distance des autres marges (note D) : \_\_\_\_\_

 Marges atteintes par le carcinome infiltrant

Préciser les marges, selon l'orientation, si possible : \_\_\_\_\_

 Marges exemptes de carcinome in situ y compris la dysplasie modérée et sévère\*) (note D)

Distance de la marge la plus proche :

Préciser la distance : \_\_\_\_\_ cm

 Ne peut être évaluée

Préciser la localisation de la marge la plus proche, selon l'orientation, si possible : \_\_\_\_\_

+ Localisation et distance des autres marges (note D) : \_\_\_\_\_

 Marges atteintes par le carcinome in situ y compris la dysplasie modérée et sévère\*) (note D)

\* Seulement applicable au carcinome épidermoïde et ses variantes histologiques

**Envahissement lymphovasculaire** Non décelé Présent Indéterminé**Envahissement périnerveux (note F)** Non décelé Présent Indéterminé**+ Effet du traitement (applicable aux carcinomes soumis à un traitement néoadjuvant)**+  Non décelé+  Présent (préciser) : \_\_\_\_\_+  Indéterminé**Stade pathologique (pTNM) (note H)****Descripteurs TNM (seulement si applicables) (sélectionner tous les éléments applicables)** m (tumeurs primaires multiples) r (récidive) y (post-traitement)**Tumeur primaire (pT)** pTX : Ne peut être évaluée pT0 : Aucune tumeur primaire décelée pTis : Carcinome in situ**Suite de la section à la page suivante**

**Stade pathologique (pTNM) (note H) – suite****Pour tous les carcinomes excluant les mélanomes muqueux**Tumeur primaire (pT) : **Supraglottique**

- pT1 : Tumeur confinée à une seule zone de la région supraglottique avec mobilité normale de la corde vocale
- pT2 : La tumeur envahit la muqueuse de plus d'un site adjacent de la région supraglottique ou glottique ou de la région extérieure à la zone supraglottique (p. ex. : muqueuse de la base de la langue, vallécule, portion médiale du sinus pyriforme) sans fixation du larynx
- pT3 : Tumeur confinée au larynx avec fixation de la corde vocale et/ou envahissement d'une des structures suivantes: région rétro-cricoïdienne, espace pré-épiglottique, espace para-glottique, et/ou cortex interne du cartilage thyroïdien
- pT4a : Maladie locale moyennement avancée. La tumeur envahit à travers le cartilage thyroïde et/ou envahit les tissus au-delà du larynx (p. ex. : trachée, tissus mous du cou y compris les muscles extrinsèques profonds de la langue, les muscles de la sangle, la thyroïde ou l'œsophage)
- pT4b : Maladie locale très avancée. La tumeur envahit l'espace pré-vertébral, engage l'artère carotide, ou envahit les structures médiastinales

Tumeur primaire (pT) : **Glottique**

- pT1 : Tumeur limitée à une ou deux cordes vocales (peut envahir la commissure antérieure ou postérieure) avec une mobilité normale
- pT1a : Tumeur limitée à une corde vocale
- pT1b : Tumeur impliquant les deux cordes vocales
- pT2 : La tumeur s'étend à la région supraglottique et/ou à la région sous-glottique et/ou affecte la mobilité de la corde vocale
- pT3 : Tumeur limitée au larynx avec fixation de la corde vocale et/ou envahit l'espace para-glottique et/ou érode le cartilage thyroïde de façon mineure (p. ex. : cortex interne) (note H)
- pT4a : Maladie locale moyennement avancée. La tumeur envahit le cartilage thyroïde ou cricoïde et/ou envahit les tissus au-delà du larynx (p. ex. : la trachée, les tissus mous du cou y compris les muscles profonds extrinsèques de la langue, les muscles de la sangle, la thyroïde ou l'œsophage)
- pT4b : Maladie locale très avancée. La tumeur envahit l'espace pré-vertébral, engage l'artère carotide, ou envahit les structures médiastinales

Tumeur primaire (pT) : **Sous-glottique**

- pT1 : La tumeur est limitée à la région sous-glottique
- pT2 : La tumeur s'étend à une ou aux deux cordes vocales dont la mobilité est conservée ou atteinte
- pT3 : La tumeur est limitée au larynx avec fixation d'une corde vocale
- pT4a : Maladie locale moyennement avancée. La tumeur envahit le cartilage thyroïde ou cricoïde et/ou envahit les tissus au-delà du larynx (p. ex. : La trachée, les tissus mous du cou y compris les muscles profonds extrinsèques de la langue, les muscles de la sangle, la thyroïde ou l'œsophage)
- pT4b : Maladie locale très avancée. La tumeur envahit l'espace pré-vertébral, engage l'artère carotide ou envahit les structures médiastinales

**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)\* (notes I à L)**

- pNX : Ne peuvent être évalués
- pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase
- pN1 : Métastase à un seul ganglion lymphatique régional ipsilatéral, de 3 cm ou moins dans sa plus grande dimension
- pN2 : Métastase(s) à un seul ganglion lymphatique ipsilatéral, mesurant plus de 3 cm mais ne dépassant pas 6 cm dans sa plus grande dimension, ou au niveau de plusieurs ganglions lymphatiques ipsilatéraux, aucune de plus de 6 cm dans sa plus grande dimension ou dans des ganglions lymphatiques bilatéraux ou contralatéraux, aucune de plus de 6 cm dans sa plus grande dimension
- pN2a : Métastase à un seul ganglion lymphatique régional ipsilatéral, mesurant plus de 3 cm mais ne dépassant pas 6 cm dans sa plus grande dimension
- pN2b : Métastases à plusieurs ganglions lymphatiques régionaux ipsilatéraux, sans dépasser 6 cm dans leur plus grande dimension
- pN2c : Métastases dans des ganglions lymphatiques régionaux bilatéraux ou contralatéraux, sans dépasser 6 cm dans leur plus grande dimension
- pN3 : Métastase à un ganglion lymphatique, de plus de 6 cm dans sa plus grande dimension
- Aucun ganglion soumis ou retrouvé

**Suite de la section à la page suivante**

N° de rapport

N° de dossier

**Stade pathologique (pTNM) (note H) – suite****Nombre de ganglions examinés**

Préciser : \_\_\_\_\_

 Ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_**Nombre de ganglions atteints**

Préciser : \_\_\_\_\_

+ Taille (plus grande dimension) du plus grand foyer métastatique dans le ganglion lymphatique : \_\_\_\_\_ cm

 Le nombre ne peut être déterminé (expliquer) : \_\_\_\_\_

Extension extracapsulaire

 Non décelée Présente

+ Distance de la capsule du ganglion lymphatique : \_\_\_\_\_ mm

 Indéterminée**Métastase(s) à distance (pM)** Non applicable pM1 : Métastase(s) à distance

+ Préciser le ou les site(s), si connu(s) : \_\_\_\_\_

**Pour mélanome muqueux****Tumeur primaire (pT)** pT3 : Maladie confinée à la muqueuse pT4a : Maladie moyennement avancée. La tumeur s'étend aux tissus mous profonds, au cartilage, aux os ou à la peau sus jacente pT4b : Maladie très avancée. La tumeur s'étend au cerveau, à la dure-mère, à la base du crâne, aux nerfs crâniens inférieurs (IX, X, XI, XII), à l'espace masticateur, à l'artère carotide, à l'espace prévertébral, ou aux structures médiastinales**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)** pNX : Ne peuvent être évalués pN0 : Ganglions lymphatiques régionaux exempts de métastase pN1 : Métastase(s) dans les ganglions lymphatiques régionaux**Métastase(s) à distance (pM)** Non applicable pM1 : Métastase(s) à distance

+ Préciser le ou les site(s), si connu(s) : \_\_\_\_\_

**+ Autres constatations pathologiques (sélectionner tous les éléments applicables)**+  Aucune+  Dysplasie kératinisante+  Légère+  Modérée+  Sévère (carcinome in situ)+  Dysplasie non kératinisante+  Légère+  Modérée+  Sévère (carcinome in situ)+  Inflammation (préciser le type) : \_\_\_\_\_+  Métaplasie malpighienne+  Hyperplasie épithéliale+  Colonisation+  Fongique+  Bactérienne+  Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

